

Nachsorgeplan

Kolonkarzinom

Stadium I (pT1-2N0M0)

	6	18	24	36	48	60
Anamnese, Untersuchung	X		X			X
Labor, CEA	X		X			X
OBS	X		X			X
Koloskopie*	X		X			X

Stadium II (pT3-4N0M0)

Stadium III (pTxN1-2M0)

	6	12	18	24	30	36	48	60
Anamnese, Untersuchung	X	X	X	X	X	X	X	X
Labor, CEA	X	X	X	X	X	X	X	X
OBS	X	X	X	X	X	X	X	X
Rö.-Thorax		X		X		X		X
Koloskopie*	X			X				X
CT**								

* Drei Monate postoperativ, wenn präoperativ eine Abklärung des gesamten Kolons nicht möglich war. Nach dem fünften Jahr alle drei Jahre Koloskopie. Bei HNPCC zweijährige Koloskopie bzw. nach subtotaler Kolektomie: Rektoskopie

** CT befundorientiert (z. B. unklarer Sonografiebefund, Tumormarkeranstieg).

HNPCC: ohne subtotale Kolektomie: alle 2 Jahre Koloskopie, wenn kein Adenom-Nachweis in der Voruntersuchung, bei Adenom-Nachweis jährlich
 Nach subtotaler Kolektomie: alle 2 Jahre Rektoskopie, jährliche gynäkologische Untersuchung, Urinzytologie

Quellennachweis:

- (1) Interdisziplinäre Leitlinie der Deutschen Krebsgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten
- (2) Chirurgische Onkologie, TU München 10/04